



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA VACUNACIÓN FRENTE A SARS-CoV-2
Comirnaty® monovalente XBB.1.5 30 mcg

Marcar con una X a qué grupo pertenece:

- Personal de 60 años o más **(A)**
- Personal menor de 60 años con condiciones de riesgo: **(B)**
 - ✓ Enfermedades crónicas del sistema cardiovascular.
 - ✓ Enfermedad respiratoria crónica, incluida asma, displasia, fibrosis quística y patología pulmonar confirmada tras padecimiento de COVID-19.
 - ✓ Enfermedades neurológicas y neuromusculares graves.
 - ✓ Enfermedades metabólicas crónicas (incluye diabetes mellitus). Obesidad mórbida (IMC≥40).
 - ✓ Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico. Enfermedad renal crónica.
 - ✓ Enfermedad inflamatoria crónica. Enfermedad celíaca. Asplenia.
 - ✓ Hemoglobinopatías y anemias. Trastornos de coagulación, receptores de transfusiones.
 - ✓ Portadores de implantes cocleares o a la espera de recibirlo.
 - ✓ Cáncer, inmunosupresión primaria, causada por VIH o por fármacos.
 - ✓ Trastornos o enfermedades que conllevan disfunción cognitiva.
- Personal de centros sanitarios, residencias de personas mayores y atención a la discapacidad (tanto sanitarios como no sanitarios). **(C)**
- Personas que pueden transmitir la enfermedad a personas con alto riesgo de complicaciones (convivientes, cuidadores, etc.). **(D)**
- Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y en posparto (hasta 6 m). **(E)**
- Personal de servicios esenciales. **(F)**

CONTRAINDICACIONES:

- Si es alérgico al principio activo o a algún componente de la misma: raxtozinamerán, ((4-hidroxi-butil) azanodiol)bis(hexano-6,1-diol)bis(2-hexildecanoato) (ALC-0315), 2-[(polietilenglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamida (ALC-0159), 1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfolina (DSPC), polietilenglicol colesterol, trometamol, hidrócloruro de trometamol, sacarosa.
- Reacción hipersensibilidad grave (de tipo anafiláctico) o una reacción alérgica inmediata de cualquier gravedad a una dosis previa de vacuna de ARNm frente a la COVID-19.

En caso de enfermedad aguda grave con fiebre y afectación general la inmunización se pospondrá.

REACCIONES ADVERSAS:

Las más frecuentes: dolor en el lugar de la inyección (>60%), fatiga (>50%), cefalea (>40%), dolor muscular (>20%) y escalofríos y artralgia (>10%).

Además, se han observado casos muy raros de miocarditis y pericarditis fundamentalmente en varones jóvenes tras la segunda dosis.

Se recomienda esperar para vacunarse al menos 3 meses desde la última dosis administrada o infección padecida, independientemente del número de dosis recibidas previamente.

Tras la vacunación se recomienda permanecer unos minutos en observación.

Doy mi consentimiento para la administración de la vacuna frente a SARS-CoV-2:

Nombre y Apellidos: _____ DNI: _____

Fecha de nacimiento: __/__/____ Consejería: _____

Fecha y firma: __/__/2023